

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **NEO-ANGIN BEZ CUKRU**

Pastilky

(Dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum, levomentholum)

#### **Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.**

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Neo-angin bez cukru musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů ( u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat
3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat
6. Další informace

### **1. CO JE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Neo-angin bez cukru má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.

Desinfikuje ústní a krční dutinu a hltan. Užívá se při bolestech v krku, kataru, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor, afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU POUŽÍVAT**

#### **Nepoužívejte přípravek Neo-angin bez cukru:**

- Jestliže máte astma a chronický zánět hltanu atrofického typu (s úbytkem sliznice apod.).
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na anýz (badyán) nebo na kteroukoli složku přípravku.

Přípravek je nevhodný pro děti do 6 let.

#### **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**

Přípravek je možné užívat současně s antibiotiky a uklidňujícími léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

#### **Těhotenství a kojení**

Užívání se nedoporučuje.

## **Důležité informace o některých složkách přípravku Neo-angin bez cukru**

Pro diabetiky

1 pastilka Neo-anginu bez cukru je oslazená roztokem maltitolu 2579 mg, odpovídá 25 kJ (5,9 kcal).

Pomocná látka ponceau 4R může způsobit alergickou reakci včetně záchvatu průduškového astmatu. Alergická reakce je častější u pacientů se známou přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou.

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, není pro Vás užívání tohoto přípravku vhodné

## **3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU POUŽÍVÁ**

Pokud není předepsáno jinak, dospělí a děti od 15 let nechat rozpustit každé 2-3 hodiny 1 pastilku v ústech, maximálně 6 pastilek denně. Děti od 6-7 let ráno, v poledne a večer 1 pastilku a děti od 8-15 let 4krát denně 1 pastilku s odstupem alespoň 4 hodin. Přetrvávají-li příznaky onemocnění u dospělých déle než 5 dní (3 dny u dětí), doporučujeme navštívit lékaře. I při další léčbě lékařem lze v doporučených dávkách Neo-angin bez cukru užívat jako podpůrný lék po dobu 2-3 týdnů.

### **Jestliže jste užil(a) více přípravku Neo-angin bez cukru než jste měl(a).**

Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neo-angin bez cukru

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin bez cukru, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

## **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin bez cukru nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout příležitostně alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev, projevující se horečkou, třesavkou a průjemem. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poradte se s lékařem. Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

## **5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN UCHOVÁVAT**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí

## **6. DALŠÍ INFORMACE**

### **Co přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje:**

Léčivými látkami jsou dichlorbenzenmethanol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg, levomentholum 5,72 mg v 1 pastilce.

Pomocnými látkami jsou badyánová silice, silice máty peprné, roztok maltitolu, kyselina vinná, ponceau 4R 80%.

### **Jak přípravek Neo-angin bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení**

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje ploché, červené, kulaté pastilky.

Velikost balení: 6, 12, 16, 18, 24 nebo 48 pastilek

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

**Tato příbalová informace byla naposledy schválena:**

11.6. 2008