

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Neo-angin spray

Orální sprej

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Divapharma GmbH,

D-12274 Berlin, Německo

Složení

léčivé látky v 10 ml roztoku:

Dichlorbenzenmethanolum 145,8 mg,

Amylmetacresolum 29,2 mg,

Mentholum 8,7 mg.

Pomocné látky: badyánová silice, silice máty peprné, ethanol 96%, propylenglykol.

Indikační skupina

Otorinolaryngologikum, antiseptikum

Charakteristika

Přípravek je účinný proti širokému spektru grampozitivních bakterií, také kvasinkám a infekcím mykotického (houbovitého) původu. Jeho baktericidní účinek (ničící bakterie) je zvláště rychlý.

Indikace

Přípravek se jako sprej používá k prevenci a léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění ústní a krční dutiny a hltanu. Užívá se při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, potížích při polykání, zánětech sliznice v ústní dutině, zánětech dásní a hltanu a jako podpůrná léčba u angíny. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let. Těhotné a kojící ženy mohou užívat přípravek pouze po poradě s lékařem.

Kontraindikace

přípravek nesmí užívat nemocní s precitlivělostí na některou jeho složku a nemocní s chronickým zánětem hrtanu atrofického typu.

Nežádoucí účinky

přípravek je obvykle dobře snášen ale mohou se vyskytnout alergické reakce dýchacích cest nebo žaludečního a střevního ústrojí, projevující se horečkou, třesavkou a průjmem.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo i jiných neobvyklých reakcí přerušete užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Interakce

interakce nejsou dosud známy

Dávkování a způsob použití

pokud lékař neurčí jinak, používají děti od 12 let a dospělí dávku (t.j. dvakrát stisknout trysku, zavedenou co možno nejhlouběji do úst a nasměrovanou proti bolavému místu) až 6krát denně. Během aplikace je třeba zadržet dech.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá po dobu 2-3 týdnů.

Upozornění

O vhodnosti současného užívání neo-anginu a jiných léků se porad`te s lékařem. Pokud se do 7 dnů stav nebo příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, porad`te se o dalším užívání s lékařem. Dojde-li k předávkování nebo k náhodnému požití přípravku dítětem porad`te se s lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

Mechanický rozprašovač o obsahu 15 ml a 30 ml.

Datum revize textu

22.11. 2006