

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Bronchicum® Saft

Dickextrakt aus Thymiankraut 2,250 g/100 g Flüssigkeit

Dickextrakt aus Primelwurzel 0,325 g/100 g Flüssigkeit,

Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr, Heranwachsenden und Erwachsenen.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bronchicum® Saft jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach ca. 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Bronchicum® Saft* und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Bronchicum® Saft* beachten?
3. Wie ist *Bronchicum® Saft* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Bronchicum® Saft* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST BRONCHICUM® SAFT UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Bronchicum® Saft ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Bronchicum® Saft wird angewendet zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON BRONCHICUM® SAFT BEACHTEN?

***Bronchicum® Saft* darf nicht eingenommen werden bei**

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Primel, Thymian oder anderen Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuss, Sellerie oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
- Säuglingen unter 1 Jahr.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von *Bronchicum® Saft* ist erforderlich

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei

Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme/Anwendung von *Bronchicum® Saft* mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Bronchicum® Saft soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Bronchicum® Saft*

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie *Bronchicum® Saft* erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

3. WIE IST BRONCHICUM® SAFT EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie *Bronchicum® Saft* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet ist die übliche Dosis:

Alter bzw. (Körpergewicht)	Einzel-dosis	Tages-gesamtdosis
Kinder von 1-6 Jahre (ca. 8-20 kg)	5 ml 2-mal täglich	10 ml (entsprechend 255 mg Thymiankraut-dickextrakt und 37 mg Primelwurzel-dickextrakt)
Kinder von 7-12 Jahre (ca. 21-43 kg)	5 ml 2- bis 3-mal täglich	10 -15 ml (entsprechend 255 - 383 mg Thymiankraut-dickextrakt und 37 - 56 mg Primelwurzel-dickextrakt)
Heranwachsende ab 12 Jahre und Erwachsene	5 ml 3- bis 4-mal täglich	15 – 20 ml (entsprechend 383 - 510 mg Thymiankraut-dickextrakt und 56 - 74 mg Primelwurzel-dickextrakt)

Bronchicum® Saft soll unverdünnt mittels des beigefügten Messbechers eingenommen werden.

Flasche vor Gebrauch schütteln!

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung. Im Zweifelsfall befragen Sie einen Arzt. Beachten Sie bitte in jedem Fall die Angabe unter Punkt 2 sowie die Angaben unter Punkt 4.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Bronchicum® Saft* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von *Bronchicum® Saft* eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Einnahme zu großer Mengen von *Bronchicum® Saft* können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden möglicherweise verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von *Bronchicum® Saft* vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Dosis *Bronchicum® Saft* ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *Bronchicum® Saft* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	mehr als 1 Behandelte von 10
<i>Häufig:</i>	1 bis 10 Behandelte von 100
<i>Gelegentlich:</i>	1 bis 10 Behandelte von 1.000
<i>Selten:</i>	1 bis 10 Behandelte von 10.000
<i>Sehr selten:</i>	weniger als 1 Behandelte von 10.000
<i>Nicht bekannt:</i>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum auftreten. Gelegentlich kann es auch zu Magen-Darm-Beschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf *Bronchicum® Saft* nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST *BRONCHICUM® SAFT* AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen: Nicht über 25°C lagern!

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach Öffnung der Flasche sollte der Inhalt innerhalb von 8 Wochen aufgebraucht und Reste verworfen werden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was *Bronchicum® Saft* enthält:

Die Wirkstoffe sind: Dickextrakte aus Thymiankraut und Primelwurzel

100 g (entsprechend 88,1 ml) Flüssigkeit enthalten:

Dickextrakt aus Thymiankraut (5 – 7 : 1),	
Auszugsmittel: Methanol 25 % (V/V)	2,250 g
Dickextrakt aus Primelwurzel (6 – 10 : 1),	
Auszugsmittel: Wasser	0,325 g,

Die sonstigen Bestandteile sind:

Glycerol 85 %, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph. Eur), Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur), Citronensäure, Xanthangummi, Honigaroma, Pflaumenaroma, Natriumcycamat, Saccharin-Natrium, Kaliumsorbat, gereinigtes Wasser.

Wie *Bronchicum® Saft* aussieht und Inhalt der Packung

Flasche mit 150 ml Flüssigkeit

Naturbedingte Trübungen dieses pflanzlichen Arzneimittels haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit dieses Arzneimittels.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln
Telefon: 0800/1652-200, Telefax: 0800/1652-700
E-Mail: dialog@cassella-med.eu

Hersteller:

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41
12277 Berlin

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2011.