

neo-angin®

HALSSPRAY

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss neo-angin® Halsspray jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3-4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist neo-angin® Halsspray und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halsspray beachten?
3. Wie ist neo-angin® Halsspray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist neo-angin® Halsspray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

neo-angin® Halsspray

Wirkstoffe in 10 ml Spray: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 145,8 mg, Amylmetacresol 29,2 mg, Levomenthol 8,7 mg

1. Was ist neo-angin® Halsspray und wofür wird es angewendet?

neo-angin® Halsspray ist ein Hals- und Rachen therapeutikum.

Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halsspray beachten?

neo-angin® Halsspray darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin® Halsspray sind,
- von Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren,
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von neo-angin® Halsspray kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Bei Anwendung von neo-angin® Halsspray mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin® Halsspray in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin® Halsspray darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von neo-angin® Halsspray

Dieses Arzneimittel enthält 23,8 Vol.-% Ethanol. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

