
UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara.

Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželeti da ga ponovo pročitate.

Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 4 do 5 dana, obavezno posetite Vašeg lekara!

neo-angin[®] pastile

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:	neo-angin[®] 0.6 mg + 1.2 mg + 5.9 mg pastila
Nezaštićeno, generičko ime:	amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol
Sadržaj aktivnih supstanci:	1 pastila sadrži: amilmetakrezol 0.6 mg 2,4-dihlorbenzil alkohol 1.2 mg levomentol 5.9 mg
Sadržaj pomoćnih supstanci:	Etarsko ulje zvezdastog anisa; etarsko ulje pitome nane; saharoza; vinska kiselina; glukoza, tečna; košenila crvena A (E124)
Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:	D.o.o. Polifarm, Zlatiborska 2V, Beograd
Naziv i adresa proizvođača:	DIVAPHARMA GMBH Motzener Str. 41, Nemačka, Berlin

1. ŠTA JE LEK neo-angin® I ČEMU JE NAMENJEN?

SASTAV

Farmaceutski oblik i sadržaj 1 pastila sadrži: amilmetakrezol 0.6 mg; 2,4-dihlorbenzil alkohol 1.2 mg; levomentol 5.9 mg
Objašnjenje

PAKOVANJE

Ime leka	Farmaceutski oblik	Jačina	Pakovanje	Broj rešenja i datum
neo-angin®	pastila	0.6 mg + 1.2 mg + 5.9 mg	24 pastile	640/2006/12 od 17.05.2006.

Crvene, okrugle, blago providne pastile.

KAKO LEK neo-angin® DELUJE?

Pastile neo-angin® suzbijaju, odnosno ublažavaju simptome kod upalnih, katarnih oboljenja u području usne duplje i ždrela. Pastile neo-angin® deluju brzo, dobro se podnose i imaju prijatan ukus.

KADA SE LEK neo-angin® UPOTREBLJAVA?

Za prevenciju i lečenje upalnih i zaraznih oboljenja u području usne šupljine, grla i ždrela kao što su grlobolja, promuklost, teškoće kod gutanja, zapaljenja krajnika (tonzilitis, angina), zapaljenja sluzokože usta (stomatitis, soor, afte), desni (gingivitis), katar ždrela (faringitis), katar grkljana (laringitis), te preventive kod gripoznih infekcija.

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

KADA NE SMETE UZIMATI LEK

Preosetljivost na neki od sastojaka leka. Nije za decu ispod 6 godina starosti, zbog veličine pastile. Pacijenti koji boluju od retkog naslednog oboljenja netolerancije na fruktozu, loše glukožno-galaktozne apsorpcije ili saharoza-izomaltaza insuficijencije, ne smeju koristiti ovaj lek.

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Upozorenje za dijabetičare!

1 pastila odgovara 0,22 BE. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata sa dijabetes melitusom.

Lek može biti štetan za zube.

PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Za primenu pastila za grlo, neo-angin[®], u trudnoći i tokom perioda dojenja ne postoje dovoljna ispitivanja. Zato se pastile za grlo neo-angin[®], u trudnoći i tokom perioda dojenja primenjuju samo posle konsultovanja sa lekarom.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA

Nema uticaja.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK neo-angin[®]

Lek sadrži boju E 124 koja može izazvati alergijske reakcije.

Lek sadrži 1,14 g glukoze i 1,42 g saharoze po pastili.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Interakcije nisu poznate.

3. KAKO SE LEK neo-angin[®] UPOTREBLJAVA

Ukoliko mislite da lek neo-angin[®] suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Molimo Vas da se pridržavate uputstva za upotrebu, pošto u suprotnom pastile za grlo neo-angin[®] neće pravilno delovati.

Ukoliko nije drugačije propisano, odrasli i deca starija od 6 godina treba da na 2-3 sata u ustima polako rastope jednu pastilu. Maksimalna dnevna doza je 6 pastila. Trajanje upotrebe nije ograničeno.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka neo-angin[®] nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka možete očekivati nadražaj oralne i gastrointestinalne sluzokože.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK neo-angin[®]

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Dalju upotrebu nastavite na navedeni način.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA

U veoma retkim slučajevima se može javiti nadražaj oralne i gastrične sluzokože. Takođe su moguće alergijske reakcije.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

ČUVANJE

Držati lek neo-angin® van domašaja dece!

Ne čuvati iznad 25°C.

ROK UPOTREBE

3 godine.

Rok upotrebe ovog pakovanja je odštampan na kutiji i na foliji blister pakovanja.

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.

NAČIN IZDAVANJA LEKA

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neupotrebljeni lek i sav otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.

DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA

Maj, 2006