

neo-angin® brez sladkorja

NAVODILO ZA UPORABO

neo-angin®

brez sladkorja

1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg pastile

2,4-diklorobenzil alkohol/amilmetakrezol/levomentol

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 3 – 4 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo neo-angin® brez sladkorja in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo neo-angin® brez sladkorja
3. Kako jemati zdravilo neo-angin® brez sladkorja
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila neo-angin® brez sladkorja
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO NEO-ANGIN® BREZ SLADKORJA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja je antiseptik in blag analgetik za usta in žrelo. Namenjeno je za zgodnje lokalno zdravljenje blagih okužb ust in žrela, s čimer se lahko zmanjša tudi poraba antibiotikov. Te okužbe povzročijo vnetja ustne votline in žrela s simptomi, kot so bolečine v žrelu in hripavost, vnetja ustne sluznice in vnetja dlesni.

2. KAJ MORATE VEDETI PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO NEO-ANGIN* BREZ SLADKORJA

Ne jemljite zdravila neo-angin® brez sladkorja

- če ste preobčutljivi (alergični) na zdravilne učinkovine ali katerikoli sestavino zdravila neo-angin® brez sladkorja. Te so našteje v 6. poglavju DODATNE INFORMACIJE.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila neo-angin® brez sladkorja

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če karkoli izmed spodaj navedenega velja za vas:

- če se vaše težave po 3 – 4 dnevem jemanju zdravila neo-angin* brez sladkorja ne izboljšajo ali se celo poslabšajo;

- če imate dolgotrajen (kronični) kašelj ali hripavost. Omenjena simptoma sta lahko posledica morebitnih malignih obolenj.

Zdravilo neo-angin brez sladkorja vsebuje barvilo rdeče 4R (E124) in tekoči maltitol. Dodatne informacije o pomožnih snoveh so navedene v poglavju »Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila neo-angin®«.

Jemanje drugih zdravil

Ni znano, da bi zdravilo neo-angin® brez sladkorja vplivalo na delovanje drugih zdravil. Priporočamo, da hkrati ne jemljete drugih zdravil za oralno uporabo, to je za uporabo v ustni votlini in žrelu.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila neo-angin brez sladkorja skupaj s hrano in pijačo

Na voljo ni podatkov, ki bi dokazovali, da hrana ali pijača vplivata na delovanje zdravila. Neposredno po jemanju zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Podatkov o uporabi zdravila neo-angin® brez sladkorja pri nosečnicah ni. Opravljene raziskave na živalih niso pokazale neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov v zvezi z nosečnostjo, embrionalnim oz. fetalnim razvojem, med porodom ali po porodu.

Uporabe zdravila neo-angin® brez sladkorja med nosečnostjo in dojenjem ne priporočamo, ker ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila v teh obdobjih.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila neo-angin brez sladkorja

- Zdravilo vsebuje nadomestek sladkorja, tekoči maltitol. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev (imate intoleranco za nekatere sladkorje), se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.
- To zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R (E124), ki lahko povzroči alergijske reakcije.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO NEO-ANGIN® BREZ SLADKORJA

Pri jemanju zdravila neo-angin® brez sladkorja natančno upoštevajte navodila za pravilno uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.

Navodila za pravilno uporabo

Zdravilo neo-angin _ je namenjeno za uporabo v ustih in žrelu (oralna uporaba). Odrasli in otroci, starejši od 6 let, počasi raztopite v ustih po eno pastilo, na vsake 2 do 3 ure. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Zdravljenje lahko traja 3 – 4 dni. Če se vaše težave v tem času ne izboljšajo, ali se celo poslabšajo, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila neo-angin® brez sladkorja, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se v primeru neželenih učinkov posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zaenkrat ni znanih primerov prevelikega odmerjanja tega zdravila. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, je možno, da se bo pojavilo draženje ustne ali želodčne sluznice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo neo-angin® brez sladkorja

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo neo-angin® brez sladkorja neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki so navedeni po pogostnosti:

zelo pogosti pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom
pogosti pojavijo se pri manj kot 1 od 10 bolnikov, vendar pri več kot 1 od 100 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom

občasni pojavijo se pri manj kot 1 od 100 bolnikov, vendar pri več kot 1 od 1000 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom

redki pojavijo se pri manj kot 1 od 1000 bolnikov, vendar pri več kot 1 od 10.000 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom

zelo redki pojavijo se pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov, ki se zdravijo s tem zdravilom

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

Zelo redki: draženje ustne ali želodčne sluznice.

Če se pojavi alergijska reakcija, prenehajte jemati pastile in se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA NEO-ANGIN® BREZ SLADKORJA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Pretisne omote shranjujte v škatli, za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila neo-angin® brez sladkorja ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatlici in pretisnem omotu, poleg oznake »Uporabno do«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila neo-angin® brez sladkorja, če opazite, da so se pastile raztopile.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo neo-angin® brez sladkorja

Zdravilne učinkovine so:

Ena pastila vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:

2,4-diklorobenzil alkohol 1,20 mg

amilmetakrezol 0,60 mg

levomentol 5,72 mg

Pomožne snovi so: eterično olje zvezdastega janeža, eterično olje poprove mete, tekoči maltitol, vinska kislina, rdeče 4R (E 124).

Izgled zdravila neo-angin® brez sladkorja in vsebina pakiranja

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja je v obliki pastil. Pastile so rdeče barve, okrogle in rahlo prosojne. Zdravilo neo-angin® brez sladkorja je na voljo v škatlah s 24 pastilami (dva pretisna omota s po 12 pastilami).

Način izdaje zdravila neo-angin® brez sladkorja

Izdaja zdravila brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

DIVAPHARMA GmbH, Motzener Straße 41, D-12277 Berlin, Nemčija

Navodilo je bilo odobreno 05.06.2008